




苗栗區農業改良場  
Miaoli District Agricultural Research and Extension Station

# 荔枝椿象

## *Tessaratoma papillosa*

### 介紹及防治



## 荔枝椿象

半翅目 Hemiptera

荔枝椿象科 Tessaratomidae

荔枝椿象一年一世代，分卵、若蟲及成蟲3個時期。

**卵期** | 每年3~6月為產卵高峰期，一卵片14顆卵，新鮮卵綠色或淡黃色，近孵化呈紅色，孵化約10~12天。

**若蟲期** | 共5個齡期，若蟲無翅，不會飛行。體色橙紅色，外圍具有黑色框線。

**成蟲期** | 體呈盾形，黃褐色，胸部腹面披白色臘粉，成蟲越冬至隔年產卵，約200~300天。



**危害人體** | 荔枝椿象成蟲及若蟲受擾動時會噴出具有腐蝕性臭液，造成果實及葉片灼傷，如觸及人體皮膚或眼睛，會引起刺痛感及過敏等症狀。

**危害植物** | 以危害龍眼、荔枝、無患子及台灣欒樹等無患子科植物為主。成蟲及若蟲均以刺吸式口器吸食嫩芽、嫩梢、花穗及幼果等部位，造成落花、落果。



剛產之卵為鮮綠色或黃色，近孵化轉紅色



一齡若蟲



二至五齡若蟲體橙紅色



成蟲體呈盾形，黃褐色